

Vacuna Antineumocócica

TIPO DE VACUNA

Vacuna conjugada

DESCRIPCIÓN

Es una vacuna que previene las infecciones invasivas graves, de los serotipos más comunes de *Streptococcus pneumoniae* o neumococo

COMPOSICIÓN

Cada dosis de 0.5 ml contiene:

Polisacárido neumocócico para serotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F y 23F, 2.2mcg de cada uno

Polisacárido neumocócico para serotipo 6B, 4.4mcg

Proteína diftérica CRM197-34 mcg

Aluminio como adyuvante en forma de fosfato de aluminio 125 mcg

Otros ingredientes polisorbato 100 mcg, cloruro de sodio y agua para inyección

PRESENTACIÓN

Frasco de 0.5 ml, suspensión homogénea de color blanco al mezclar con movimientos rotatorios

Jeringa descartable de 1 cc y aguja 25 G x 1", auto retráctil

INDICACIÓN

Prevención de las enfermedades invasivas provocadas por el neumococo como: Neumonías, Meningitis, Septicemia, y no invasivas como otitis media aguda, sinusitis

Posibles efectos post vacunales

Reacciones locales:

Dolor, eritema, edema e induración en el sitio de la inyección

Reacciones sistémicas:

Alza térmica, irritabilidad, somnolencia, pérdida de apetito, vómitos, diarreas, reacción cutánea

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la vacuna incluida el toxoide de la difteria

Reacción anafiláctica a una dosis previa

Uso simultáneo con otras vacunas

Administrar simultáneamente con cualquier otra vacuna, debe ser aplicada en sitios anatómicos diferentes

Esquema de Vacunación	Dosis	Conservación de la vacuna	Vía y sitio de administración
<p>Tres dosis: 2, 4 y 12 meses de edad, con intervalo mínimo de 2 meses entre cada dosis</p> <p>Los NO vacunados entre 12 y 23 meses 29 días, recibirán 2 dosis con intervalo mínimo de un mes entre cada dosis</p> <p>Los niños de 2 a 4 años, con co-morbilidad (Nefropatías, Cardiopatías, Diabetes, Hemoglobinopatías, Infección por VIH, Síndrome de Down, Neoplasia, Esplenectomizados e inmunosuprimidos), que no recibieron la vacunación previamente deben recibir una dosis</p> <p>Adultos mayores: De 60 años a más recibirá una dosis</p>	0.5 ml	<p>+ 2°C a +8°C</p> <p>Frasco abierto: Uso inmediato</p>	<p>Vía intramuscular</p> <p>Menor de 1 año: Músculo vasto externo, en la cara antero lateral externa del muslo</p> <p>De 1 a 4 años 11 meses 29 días: Músculo deltoides, cara lateral externa, tercio superior del brazo</p> <p>Adultos mayores de 60 años se aplica en la parte superior de la cara lateral externa del brazo (Región deltoides)</p>

A person is sitting at a desk, writing in a spiral notebook. On the desk, there is a white coffee cup on a saucer, a laptop, and another notebook. The scene is overlaid with a semi-transparent orange filter. The text is centered on the page.

Para mayor información puedes enviarnos un mensaje al
WhatsApp 958039279 o correo informes@aprosec.com