

Vacuna Polio Inactivada (IPV o Salk)

TIPO DE VACUNA

Vacuna de virus inactivados

DESCRIPCIÓN

Es una vacuna inyectable compuesta por poliovirus inactivados

COMPOSICIÓN

Una dosis de 0.5 ml contiene:

- Poliomielítica inactivada tipo 1 (Mahoney) 40 unidades de antígeno D*
- Vacuna poliomielítica inactivada tipo 2 (MEF-1) 8 unidades de antígeno D*
- Vacuna poliomielítica tipo 3 (Saukett) 32 unidades de antígeno D*
- Excipientes

PRESENTACIÓN

Existen 3 presentaciones:

Frasco de 0.5 ml líquida

Frasco multidosis (5,10 y 20 dosis)

Jeringa precargada de 0.5 ml

VACUNA ANTIPOLIOMIELITICA 80 LF/0.5 ml

INDICACIÓN

Prevención de la poliomielitis

Posibles efectos post vacunales

Reacciones locales:

Dolor en el sitio de la aplicación
de la vacuna

Contraindicaciones

Reacción alérgica a dosis
previas de la vacuna

Uso simultáneo con otras vacunas

Se puede aplicar
simultáneamente con cualquier
otra vacuna ya sean estas
virales o bacterianas

Esquema de Vacunación	Dosis	Conservación de la vacuna	Vía y sitio de administración
Número de dosis: 2 dosis Edad: 2 y 4 meses de edad, con intervalo de 2 meses entre dosis y dosis	0.5 ml	+ 2°C a +8°C, no exponer a la luz solar, ni congelar Frasco abierto: Uso inmediato	Intramuscular Menor de 1 año: Músculo vasto externo, en la cara antero lateral externo del muslo De 1 a 4 años 11 meses 29 días: músculo deltoides, cara lateral externa, tercio superior del brazo

A person is sitting at a desk, writing in a spiral notebook. On the desk, there is a white coffee cup on a saucer, a laptop, and another notebook. The scene is overlaid with a semi-transparent orange filter. The text is centered in the middle of the image.

Para mayor información puedes enviarnos un mensaje al
WhatsApp 958039279 o correo informes@aprossec.com